

ENTEROVAC-Plus

Suspension injectable



• **Composition :** _____

Mélange d'anatoxines des clostridium perfringens types B, C et D et clostridium d'anatoxines des clostridium speticum et novyi dans un excipient à base d'hydroxide d'aluminium libre $\leq 1,6$ mg/ml.

• **Espèces cibles :** _____

Bovins, ovins et caprins.

• **Indications :** _____

Prévention par immunisation active contre les entérotoxémies et le charbon symptomatique des ruminants, l'hépatite nécrosante, dysenterie de l'agneau et l'œdème malin de la caillette.

• **Posologie et voie d'administration :** _____

Voie parentérale : sous-cutanée, soit en avant soit en arrière de l'épaule (pour le bovin), et en arrière du coude ou à la face interne de la cuisse (pour l'ovin).

Bovins 4 ml - Ovins 2 ml - Caprins 2 ml

Modalités d'administrations : Agiter soigneusement avant emploi à fin de remettre en suspension le précipité constitué par l'hydroxyde d'aluminium.

• **Délai d'attente :** _____

Aucun.

• **Conservation :** _____

Conserver au frais entre $+2^{\circ}\text{C}$ et $+8^{\circ}\text{C}$.

Ne pas congeler.

• **Programme de vaccination :** _____

Primo-vaccination : 2 injections en sous-cutanée à 3 ou 4 semaines d'intervalle.

Vaccination annuelle : Tous les ans.

• **Précaution d'emploi :** _____

Respecter les conditions d'asepsie habituelles.

Mettre le flacon à température ambiante avant utilisation bien mélanger le flacon avant et durant l'utilisation.

Ne vacciner que les animaux en bonne santé.

• **Effets secondaires :** _____

Une légère réaction œdémateuse peut être observée au point d'injection.