



FEN-O-FLOX

Solution orale :
Enrofloxacin 10%

**Améliorer les performances
de votre cheptel**



FEN-O-FLOX SOLUTION ORALE



COMPOSITION POUR 1 LITRE

Enrofloxacin..... 100 g
Excipient q.s.p.....1000 ml

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES

L'enrofloxacin appartient à la famille des quinolones. Elle a une action bactéricide sur les germes Gram négatif et Gram positif, y compris les populations anaérobiques pathogènes. Les principaux micro-organismes sont : E. coli, Mycoplasma spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp. et Campylobacter.

L'enrofloxacin administrée à la volaille dans l'eau de boisson est rapidement et très bien absorbée avec une biodisponibilité d'environ 90 %.

Les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes 1 à 2 heures après une dose de 10 mg/kg de poids vif.

Chez les volailles l'enrofloxacin est éliminée de l'organisme avec une demi-vie de 6 heures.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement et prévention des infections gastro-intestinales et infections respiratoires causées par des micro-organismes sensibles à l'enrofloxacin, telles que les : Salmonelloses, Colibacilloses, Pasteurelloses, Coryza infectieux, Mycoplasmes.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Administration par voie orale, dans l'eau de boisson.

Posologie de base : 10 mg/kg/PV /jour, 500 ml/ tonne d'eau de boisson.

Soit calculer la formule suivante :

Nombre de volailles x Poids moyen en kg des volailles à traiter x 0,1 = Quantité totale (ml)/jour.

Traitement pendant 3 à 5 jours consécutifs ; pendant 5 jours consécutifs en cas d'infections mixtes et de formes chroniques.

MODE D'ADMINISTRATION

L'eau médicamenteuse doit être préparée chaque jour juste avant son administration. La distribution de l'eau médicamenteuse doit être continue durant la période de traitement et aucune autre source d'eau ne doit être disponible.

Le poids des animaux doit être déterminé aussi précisément que possible afin d'éviter tout sous dosage.

Les systèmes de pompage doivent être vérifiés en permanence pour assurer une médication correcte.

Avant de commencer le traitement, vider l'eau du système et le remplir ensuite avec l'eau médicamenteuse.

CONTRE INDICATION

Ne pas administrer en cas de résistance aux autres quinolones (à cause de la résistance croisée).

Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

TEMPS D'ATTENTE


Viande et abats : 12 jours

Œufs : voir rubrique contre-indications.

PRÉSENTATION

Bidon de 1 litre

Bidon de 5 litres



فين - فلو كس

هو مضاد حيوي يحتوي على اوروفلوكساسين، مستحضرات من الجيل الثالث من مجموعة الكينولون القاتلة للبكتيريا، حيث أن لديها القدرة على اختراق جدران الخلية البكتيرية والتدخل في الحامض النووي للبكتيريا، ويؤدي بذلك إلى هلاكها وهي تمتص من الأمعاء وتسري في مجرى الدم لتصل إلى الخلايا المصابة بسرعة كبيرة جدا حتى أنها تصل إلى أعلى مستوى لها في الدم بعد 1-2 ساعة من إعطائها في ماء الشرب، وبالتالي فإن تركيزها في الأنسجة المصابة يكون مرتفعا وكافيا لهلاك الميكروبات المهاجمة. وهي من مجموعة المضادات القاتلة للبكتيريا فلا تعطى مع مضادات موقفة لتكاثر البكتيريا مثل مجموعة التتراسيكلين والأرثرومايسي.

دواعي الاستخدام

يستعمل لعلاج والوقاية من التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، له تأثير قاتل على معظم البكتيريا وأهمها ميكروب القولون والسالمونيلا والباستوريلا، كما أن له تأثير نوعي على ميكروب المايكوبلازما المسبب الأساسي للمرض التنفسي المزمن والهيموفيلس المسبب لمرض الكوريزا.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يعطى في مياه الشرب.
الجرعة : 10 مغ / كغ / وزن حي / يوم، اي 500 مل / طن من مياه الشرب.

احسب الصيغة التالية :

عدد الدواجن x متوسط الوزن بالكيلو جرام من الدواجن المراد علاجها x 0.1 = الكمية الإجمالية (مل) / يوم.
العلاج لمدة 3 إلى 5 أيام متتالية.

نصائح للاستعمال

يجب إعداد حل جديد كل يوم.
يجب إعطاء الدواء بشكل مستمر خلال فترة العلاج ولا يجب توفير مصدر آخر للمياه.
يجب تحديد وزن الحيوانات على أكمل وجه لتجنب إعطاء جرعة ناقصة.
يجب فحص أنظمة الضخ باستمرار لضمان العلاج المناسب.
قبل بدء العلاج، يجب إفراغ الخزان من المياه القديمة.



Siège Social : 80 angle boulevard Abdelkarim Al Khatib et Blaye, immeuble D - 1^{er} étage - Casablanca 20 500 - **Magasin :** 43, Zone industrielle Ouled Salah centre Bouskoura. 1-3 - Casablanca 20 180 - Maroc - Tél.: +212 5 22 33 48 09 / 10 Fax: +212 5 22 33 48 32 - E-mail: contact@fedravet.com