



FLORVET 20% Solution orale : Florfénicol 20%

**Pour lutter contre les Gram positif
et Gram négatif**



FLORVET 20% SOLUTION ORALE



COMPOSITION POUR 100 ML :

| | |
|------------------|------------------|
| Florfénicol..... | 20 g |
| Excipient..... | q.s.p.....100 ml |

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES

Le florfénicol est un antibiotique synthétique à large spectre appartenant au groupe des phénicolés, actif contre la plupart des bactéries à Gram positif et Gram négatif isolées chez les volailles. Le florfénicol agit en inhibant la synthèse des protéines au niveau du ribosome et il est bactériostatique.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Chez les volailles : Affections à germes sensibles au Florfénicol : maladies respiratoires chroniques, mycoplasmoses, typhose, (Salmonella Gallinarum), pullorose (Salmonella Pullorum), fièvre typhoïde, paratyphoïde (Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium...) colibacillose (Escherichia coli), choléra aviaire (Pasteurella multocida), coryza infectieux, synovite infectieuse (Staphylococcus spp.) et omphalite.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Voie orale, à diluer dans l'eau de boisson.

Posologie usuelle : 20 mg de Florfénicol par kg de poids vif et par jour.

Volaille : 100 ml de FLORVET par tonne de poids vif et par jour. Soit, à titre indicatif et en fonction de la consommation en eau : 1 ml de FLORVET par litre d'eau de boisson et par jour.

A administrer pendant 3 à 5 jours.

MODE D'ADMINISTRATION

L'eau médicamenteuse doit être utilisée dans les 24 heures. L'eau de boisson médicamenteuse doit être la seule source d'eau pendant le traitement.

La quantité adéquate d'eau médicamenteuse sera préparée en fonction de la consommation journalière d'eau. Pour garantir un dosage correct, le poids vif doit être déterminé le plus précisément possible.

CONTRE INDICATION

Ne pas administrer aux poudeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

TEMPS D'ATTENTE


Viande et abats : 5 jours

Œufs : voir contre-indications.

PRÉSENTATION

Bidon de 1 litre

Bidon de 5 litres



فلورفيت

فلورفيت مكون من فلورفينيكول، مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم للوقاية والعلاج من أمراض الجهاز التنفسي والقناة الهضمية الناتجة عن الإصابة بـ (السالمونيلا، الباستوريلا، الإيكولاي، ستافيلوكوكس، ستريبتوكوكس، الكلورستريديوم والهيموفيللس) عند الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يعطى في مياه الشرب.

الجرعة: 20 ملغ فلورفينيكول لكل كيلوغرام من الوزن الحي يومياً.

الدواجن: 100 مل من فلورفيت لكل طن من الوزن الحي يومياً. أو،

اعتماداً على استهلاك المياه: 1 مل من فلورفيت لكل لتر من مياه

الشرب في اليوم الواحد.

يعطى لمدة 3 إلى 5 أيام.

نصائح للاستعمال

يجب إعداد حل جديد كل يوم.

يجب إعطاء الدواء بشكل مستمر خلال فترة العلاج ولا يجب توفير

مصدر آخر للمياه.

الكمية الصحيحة من الدواء يتم اعدادها وفقاً لاستهلاك المياه

اليومي. لضمان الجرعة الصحيحة، يجب تحديد الوزن الحي بدقة قدر

الإمكان.

لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري.