



KYN-O-COLI

**Solution orale :
Colistine 10%
Enrofloxacin 10%**

**Un antibiotique de référence contre
un large spectre de bactéries**

KYN-O-COLI SOLUTION ORALE



COMPOSITION POUR 100 ml

Colistine	200 M.U.I
Enrofloxacin	10 g
Excipient..... q.s.p.....	100 ml

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES

La colistine est un antibiotique polypeptidique de la famille des polymyxines. L'activité des polymyxines est de type bactéricide et s'exerce principalement vis-à-vis des bactéries gram négatif, telles que : Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella.

L'enrofloxacin est une quinolone de troisième génération, possédant un large spectre qui couvre les bactéries Gram+, Gram- et mycoplasme.

L'intérêt thérapeutique de cette association repose donc sur l'activité bactéricide de ces deux antibiotiques pouvant produire un effet synergique ainsi que par leur action complémentaire : la colistine agissant localement au niveau intestinal et l'enrofloxacin agissant par voie générale.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Prévention et traitement des maladies respiratoires chroniques (MRC) dues à des Haemophilus, des Pasteurella et surtout des Mycoplasmes.

Prévention et traitement des gastro-entérites infectieuses telles que les colibacilloses et les salmonelloses.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

A administrer en mélange à l'eau de boisson.

• **Volailles** : La posologie de base est de 100 00 UI de colistine par kg de poids corporel et de 5 mg d'enrofloxacin par kg de poids corporel par jour, soit environ 0,5 ml de KYN-O-COLI par litre d'eau de boisson par jour. Ajuster l'incorporation à la consommation des animaux.

Durée du traitement : 3 à 5 jours consécutifs.

MODE D'ADMINISTRATION

Administration par voie orale, dans l'eau de boisson.

L'eau médicamenteuse doit être utilisée dans les 24 heures.

CONTRE INDICATION

Ne pas administrer aux volailles pondueuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

Ne pas administrer en cas de résistance aux autres quinolones.

TEMPS D'ATTENTE



Viande, abats : 7 jours

Œufs : contre indiqué

PRÉSENTATION

Bidon de 1 litre.

Bidon de 5 litres.



كينو - كولي

يستعمل كين - و كولي للوقاية والعلاج من الأمراض التنفسية المزمنة بسبب الباستوريلا وخاصة الميكوبلازما. الوقاية والعلاج من التهاب المعدة والأمعاء المعدية مثل كوليباسيلوز والسالمونيلا.

الجرعة وطريقة الاستخدام

الدواجن: الجرعة الأساسية هي 10000 وحدة دولية كوليستين لكل كيلوغرام من وزن الحي و5 ملغ إنروفلوكساسين لكل كيلوغرام من وزن الحي يوميا اي حوالي 0.5 مل KYN-O-COLI لكل لتر ماء شرب يوميا.

• مدة العلاج: من 3 إلى 5 أيام متتالية.

يجب استخدام المياه التي تحتوي على الدواء في غضون 24 ساعة. لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري.