



DOUVAL

Solution orale :

Closantel 5% et Albendazole 2,5%

TRAITEMENT ET PRÉVENTION DES :

- Strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires
- Fascioloses hépatiques
- Oestroses
- Ténias



COMPOSITION POUR 100 ml

Closantel	5,0 g
Albendazole.....	2,5 g
Excipient.....q.s.p	100 ml

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES

DOUVAL est un anthelminthique associant le Closantel et l'albendazole.
Le Closantel est un anthelminthique de la famille des salicylanides actif sur la douve (F. Hepatica), les œstres et les nématodes gastro-intestinaux hématophages. Il est caractérisé par un métabolisme très lent qui lui confère une longue rémanence dans l'organisme.

L'albendazole est un anthelminthique de la famille des benzimidazoles doué d'un spectre d'activité étroit orienté essentiellement contre les nématodes digestifs. Son plus grand avantage réside dans sa très faible toxicité chez les espèces cibles. Après administration per os, l'albendazole est rapidement absorbé par voie digestive. Son absorption se fait à la fois au niveau du rumen et de l'abomasum. Environ 88% de la dose sont absorbés au niveau du rumen.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement et prévention des :

- Strongyloses gastro-intestinaux et pulmonaires.
- Fascioloses hépatiques à Fasciola hepatica.
- Oestroses
- Ténias.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale : la posologie de base est de 10 mg de closantel par kg de PV et de 5 mg d'albendazole par kg de PV, soit : 2,0 ml de DOUVAL par 10 kg de PV.

Bien agiter avant l'emploi.

Bien respecter la posologie préconisée.

CONTRE INDICATION

Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.

Eviter le surdosage pendant le premier mois de gestation chez les ovins.

TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : 28 jours

Lait : voir rubrique contre-indications.

PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml.

Bidon de 500 ml.

Bidon de 1 litre.



دوفال

دواعي الاستخدام

العلاج والوقاية من:

- مرض الكبد الفسيولوجي مع Fasciola hepatica.
- الديدان الخيطية المعوية والأمعاء الرثة والمفصليات الطفيلية والنيماتودا المعوية.
- Oestrose.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يستعمل عن طريق الفم بواسطة حقنة متدرجة.

الجرعة الأساسية هي 10 ملغ كلوسانتيل و5 ملغ من ألبندازول لكل كيلوجرام من وزن حي، أي 2 مل من دوفال لكل 10 كغم من وزن حي.

احترم الجرعة الموصوفة.

يجب التحريك جيدا قبل الاستخدام لتجانس جيد للمنتج.

تحذير :

لا يعطى للبهائم الحلوب التي حليبها ينتج قصد الاستهلاك البشري.
تجنب الجرعة الزائدة خلال الشهر الأول من الحمل في الأغنام.