



# IVERMYCINE

Solution orale :  
Ivermectine 0,088%

**POUR UN BON TRAITEMENT DES  
STRONGYLOSES GASTRO-INTESTINAUX,  
PULMONAIRES AINSI QUE L'ŒSTROSE DES  
PETITS RUMINANTS**



# IVERMYCINE SOLUTION ORALE



## COMPOSITION POUR 100 ml

Ivermectine .....	0.088
Excipient.....q.s.p .....	100 ml

## PROPRIETES PHARMACEUTIQUES

L'ivermectine est un antiparasitaire très efficace de la famille des lactones macrocycliques, ayant une activité nématocicide, insecticide et acaricide reconnue chez de nombreux animaux domestiques.

Elle présente un large spectre, actif contre un grand nombre de nématodes et d'ectoparasites tels que les agents de gales, les poux, et autres insectes. Les données pharmacocinétiques, montrent que l'ivermectine est bien absorbée et largement distribuée. Il a été démontré que l'ivermectine est efficace contre *Haemonchus contortus* et *Ostertagia circumcincta*, qui sont résistants aux benzimidazoles. L'ivermectine est un endectocide.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement et prévention des strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires ainsi que l'œstrose des petits ruminants.

## POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Administrer par voie orale à l'aide de pistolet doseur ou de seringue graduée.

200 µg d'ivermectine par kg de poids vif, soit 2.5 ml d'IVERMYCINE pour 10 kg de poids vif, en une seule administration, par voie orale.

- Afin d'administrer une dose correcte, déterminer le poids vif le plus précisément possible.
- Dans le cas où les animaux doivent être traités collectivement plutôt qu'individuellement, ils doivent être groupés en fonction de leur poids et traités avec la dose correcte afin d'éviter tout sous ou surdosage.
- Respecter la dose prescrite.
- Bien agiter la suspension avant l'utilisation pour une bonne homogénéité du produit.

## CONTRE INDICATION

Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.

Ne pas administrer aux femelles 28 jours avant la mise-bas.

## TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : 03 jours.

Lait : voir rubrique contre-indications.

## PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml.

Bidon de 1 litre.



## ايفيرميسين

### دواعي الاستخدام

يستعمل ايفيرميسين لعلاج والوقاية من الديدان الخيطية المعوية، النيماتودات المعوية، الديدان المستديرة و السير الأنفية من الأغنام والماعز. لا يؤثر على الخصوبة ويمكن أيضا أن يعطى لجميع الأعمار من الأغنام والماعز بما في ذلك الحملان.

### الجرعة وطريقة الاستخدام

يستعمل عن طريق الفم بواسطة حقنة متدرجة. الجرعة الأساسية هي 200 ميكروغرام إيفرمكتين لكل كغ وزن حي، أي 2.5 مل لكل 10 كغ من ايفيرميسين لكل كغ وزن حي. لإعطاء جرعة صحيحة، يجب تحديد الوزن الحي بأكبر قدر ممكن من الدقة.

احترم الجرعة الموصوفة.

يجب التحريك جيدا قبل الاستخدام لتجانس جيد للمنتج.

### تحذير :

لا يعطى للبهائم الحلوب التي حليبها ينتج قصد الاستهلاك البشري. لا يعطى للبهائم 28 يوم قبل الولادة.